

IMMUCOX[®]5

• Coccidiose

ESPÈCE APPROUVÉE

- Poulets

TYPE DE VACCIN

- Oocystes sporulés vivants d'*Eimeria*
 - *Eimeria acervulina*
 - *Eimeria maxima*
 - *Eimeria tenella*
 - *Eimeria necatrix*
 - *Eimeria brunetti*

PROTECTION

- Coccidiose causée par les espèces contenues dans le vaccin

PRÉSENTATION DU VACCIN

- Oocystes sporulés vivants dans une suspension liquide

VOIE D'ADMINISTRATION

- Application par gouttelettes de gel

ÂGE D'ADMINISTRATION

- Poussins d'un à trois jours

CONDITIONNEMENT (CODE DU PRODUIT)

- 10 x 1 000 doses (V55310B)
- Chaque fiole contient 10 ml de liquide

QUALITÉ

- Ce vaccin a été rigoureusement testé pour sa pureté, sa stérilité, son efficacité et son innocuité et est conforme à toutes les normes applicables de l'USDA, de l'ACIA et de Ceva.

Principaux avantages

- Vaccination efficace contre la coccidiose causée par cinq espèces d'*Eimeria* importantes du point de vue économique pour les poulets reproducteurs et les poules pondeuses
- L'application par gouttelettes de gel maintient les oocystes en suspension pendant l'application, ce qui empêche la sédimentation des oocystes et contribue à la présence uniforme dans chaque dose de toutes les espèces contenues dans le vaccin
- Offre une solution alternative naturelle et économique aux anticoccidiens

Consultez le verso et l'étiquette de l'emballage pour les directives d'utilisation complètes et toute l'information.



IMMUCOX[®] 5

VACCIN ORAL CONTRE LA COCCIDIOSE Oocystes vivants d'*Eimeria* spp.

DESCRIPTION

IMMUCOX[®] est conçu dans le but d'administrer aux poulets des doses uniformément faibles d'oocystes vivants pour contribuer au développement de l'immunité contre la coccidiose lorsqu'il est administré conformément au mode d'emploi (voir ci-dessous).

STOCKAGE

Conserver à une température de 2 °C à 8 °C. NE PAS CONGELER.

PRÉPARATION ET ADMINISTRATION

Suivre attentivement le mode d'emploi.

Pour 10 000 doses de gouttelettes de gel IMMUCOX[®] :

1. Ajouter 70 g de diluant pour pulvérisation de gel à 2,5 L d'eau distillée. Bien mélanger à l'aide d'un mélangeur.
2. Bien agiter 10 000 doses de vaccin IMMUCOX[®], verser et mélanger à l'aide d'un mélangeur.
3. Vacciner entre l'âge de 1 jour (jour de l'éclosion) et l'âge de 3 jours à raison de 25 ml pour 100 poulets à l'aide d'une machine ou d'un appareil pour gouttelettes de gel.

INGRÉDIENTS ACTIFS

Eimeria acervulina, *E. maxima*, *E. tenella*, *E. necatrix* et *E. brunetti*

PRÉCAUTIONS

- Veiller à ce qu'aucun anticoccidien (coccidiostat) ne soit utilisé dans l'alimentation. Même une faible concentration d'un anticoccidien peut réduire ou annuler l'efficacité du vaccin.
- Les antibiotiques à large spectre qui exercent une activité anticoccidienne (par exemple les tétracyclines et les sulfamides) ne doivent pas être utilisés en même temps qu'IMMUCOX[®] pendant les 16 premiers jours suivant la vaccination.
- Ne pas surdoser ou sous-doser.
- Si les oiseaux vivent dans un espace confiné (par exemple dans une aire de couvaie), ils doivent être libérés au plus tard six jours après la vaccination ou l'espace auquel ils ont accès doit être au moins doublé.
- En cas de doute, consulter le fournisseur.
- Ne vacciner que les oiseaux en bonne santé.

MISE EN GARDE

La capacité d'IMMUCOX[®] à contribuer au développement de l'immunité contre la coccidiose chez les poulets dépend de nombreux facteurs. Ceux-ci comprennent, entre autres, les conditions de stockage et la manipulation du vaccin par l'utilisateur, l'administration du vaccin, la réactivité de chaque poulet au vaccin et le respect scrupuleux du mode d'emploi et des mesures de précaution. La congélation ou des températures élevées réduiront ou annuleront la capacité du vaccin. Le non-respect du mode d'emploi ou des mesures de précaution pourrait occasionner une morbidité et une mortalité excessives. Consulter un vétérinaire spécialisé en aviculture ou un laboratoire de diagnostic pour obtenir un diagnostic approprié. Informer le vétérinaire ou le laboratoire de diagnostic que le troupeau a été vacciné avec IMMUCOX[®].



Ceva Santé Animale inc.
Guelph, Ontario

Tél. : 1 800 510-8864
www.ceva-canada.ca

Circomune[®] est une marque de commerce déposée
de Ceva Santé Animale S.A.
© 2023 Ceva Santé Animale inc. Tous droits réservés.
CA3-379-0623-F